

# 定期予防接種一覧

ワクチンの種類		対象者		接種方法	回数	
		定期接種対象年齢	標準的な接種期間			
ロタ	1価 (ロタリックス)	出生6週から24週まで	初回接種については、出生2か月から14週6日後までに開始	1回目→2回目：4週間以上の間隔をおく	2回	
	5価 (ロタテック)	出生6週から32週まで	※同一ワクチンで接種を完了してください ※吐き戻しても再接種の必要はありません	1回目→2回目：4週間以上の間隔をおく 2回目→3回目：4週間以上の間隔をおく	3回	
ヒブ <small>※接種回数・接種期間は、接種を開始する年齢によって異なります</small>		生後2か月から5歳になる前日まで	初回1回目を生後2か月から7か月未満に開始	初回：27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔を置いて3回 追加：初回（3回目）接種終了後7か月以上で（標準的には7か月から13か月の間隔を置いて）1回	4回	
			初回1回目を生後7か月から1歳未満に開始	初回：27日（医師が必要と認めた場合は20日）以上の間隔を置いて2回 追加：初回（2回目）接種終了後7か月以上で（標準的には7か月から13か月の間隔を置いて）1回	3回	
		1歳以上5歳未満	1回	1回		
		※2回目および3回目の接種は、1歳を超えた場合は行わないこと（追加接種は可能。初回接種の最後の接種後27日以上の間隔を置いて1回行う）				
小児用肺炎球菌 <small>※接種回数・接種期間は、接種を開始する年齢によって異なります</small>		生後2か月から5歳になる前日まで	初回1回目を生後2か月から7か月未満に開始	初回：27日以上の間隔を置いて3回 追加：初回（3回目）接種後60日以上の間隔をおいた後で、1歳以上に1回	4回	
			初回1回目を生後7か月から1歳未満に開始	初回：27日以上の間隔を置いて2回 追加：初回（2回目）接種後60日以上の間隔をおいた後で、1歳以上に1回	3回	
			初回1回目を1歳以上2歳未満に開始	60日以上の間隔を置いて2回	2回	
			2歳以上5歳未満	1回	1回	
※初回1回目を生後2か月から7か月未満に開始の場合、2回目および3回目の接種は2歳の前日までに行い、それを超えた場合は行わないこと（追加接種は可能） また、1歳を超えて2回目の接種を行った場合は3回目の接種は行わないこと（追加接種は可能） ※初回1回目を生後7か月から1歳未満に開始の場合、初回2回目の接種は2歳を超えた場合は行わないこと（追加接種は可能）						
B型肝炎		生後2か月から1歳になる前日まで	生後2か月から9か月未満	1回目→2回目：27日以上の間隔をおく 3回目は1回目の接種から139日以上の間隔をおく（1回目の接種日から20週後の同じ曜日から可能）	3回	
				※母子感染予防のために健康保険による予防接種を受ける場合は対象になりません		
BCG		1歳になる前日まで	生後5か月から生後8か月未満		1回	
4種混合 百日せき・ジフテリア 破傷風・不活化ポリオ		生後3か月から7歳6か月になる前日まで	【第1期初回】生後3か月から1歳未満 【第1期追加】初回接種終了後1年から1年6か月までの間隔で	第1期初回：20日以上、標準的には56日までの間隔を置いて3回 第1期追加：初回（3回目）接種後6か月以上の間隔を置いて1回 ◆3種混合・不活化ポリオの間隔および接種回数も上記枠内のとおり	4回	
MR 麻しん・風しん		第1期：1歳から2歳になる前日まで 第2期：平成27年4月2日から平成28年4月1日生まれの人 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで		第1期：1回 第2期：1回	合計2回	
水痘		1歳から3歳になる前日まで	【1回目】1歳から1歳3か月までに 【2回目】1回目接種後6か月から1年までの間隔をおく	1回目接種後、3か月以上（標準的には6か月から1年まで）の間隔を置いて2回目	2回	
日本脳炎		第1期	生後6か月から7歳6か月になる前日まで	【第1期初回】3歳から4歳 【第1期追加】4歳から5歳	第1期初回：6日以上、標準的には6日から28日までの間隔を置いて2回 第1期追加：初回（2回目）接種後6か月以上、標準的にはおおむね1年を経過した時期に1回接種	3回
		第2期	9歳から13歳になる前日まで	9歳から10歳	第2期：1回	1回
		特例	平成7年4月2日から平成19年4月1日生 平成19年4月2日から平成21年10月1日生		4回の接種を終了していない人は、20歳未満であれば定期接種として残りの回数分を受けることができる 9歳以上13歳未満の間に第1期の不足分と第2期分を定期接種として受けることができる	合計4回
2種混合 ジフテリア・破傷風		11歳から13歳になる前日まで	11歳から12歳	1回	1回	
HPV(ヒトパピローマ) <small>※現在、接種を積極的に お勧めしていませんが、 接種を希望する場合は 医師とご相談ください</small>		小学6年生から高校1年生相当の女子	中学1年生	※2種類のワクチンがありますが、それぞれ接種間隔が異なります ワクチンの「意義・効果」と「接種後に起こりえる症状」について確認し、検討してください (厚生労働省のホームページでは、HPVワクチンに関する情報をご案内しています)	3回	